


# Trou de mémoire


Tristan et Carole sont deux colocataires. Tristan se réveille après une soirée de fête, il ne se souvient plus de rien...




On a de l'aspirine ?



Bonjour Tristan... oui, ça va, merci. Toi, ne me remercie pas de t'avoir ramené à 5h et ne me demande pas ce que tu as fait avec la copine du pote de Sam et non, on n'a plus d'aspirine.



Merde, pardon... salut Carole... c'est quoi encore cette histoire ?




T'as scotché cette fille, on ne t'a plus vu de la soirée...




...capotes ?

Comme d'hab, j'en sais rien... mais que je suis con !  
Bon, je descends acheter de l'aspirine.



Prends aussi des capotes, arrête les conneries et profite-en pour faire un test de dépistage.



Ah, si je ne t'avais pas toi...

**49%** des personnes dont le sida a été diagnostiqué en 2003 ignoraient leur séropositivité, excluant toute prise en charge précoce de leur infection.

# JOUEZ LA CARTE DU DEPISTAGE

- **En cas de prise de risque :** rapport sexuel sans préservatif avec une personne de statut sérologique inconnu ou accident de préservatif pendant le rapport sexuel (déchirement ou glissement). Un premier test de dépistage du VIH/sida peut être réalisé quinze jours minimum après la prise de risque.
- **Et si vous souhaitez abandonner le préservatif dans le cadre d'une relation stable**



Consultez votre médecin traitant ou un médecin dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Il existe au moins une CDAG par département.

Pour connaître l'adresse de la CDAG la plus proche :

**Sida info service 0 800 840 800 ou [www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)**



**Ministère de la Santé  
et de la Protection sociale**

Institut National  
de Prévention  
et d'Éducation  
pour la Santé

**inpes**  
[www.inpes.sante.fr](http://www.inpes.sante.fr)